

ANNEXE 4.4-QAI

POLLUANT MICROBIOLOGIQUE : MOISSURES

Ce tableau est issu du livrable de l'année 2 du GT QEI du projet CAP2030

	Conception du bâtiment	Bâtiment à réception
Méthodes de calcul/mesure	Les résultats prédictifs peuvent être peu fiables. Cet indicateur n'est donc pas recommandé pour la phase conception.	Méthode classique : méthode par culture Les moisissures dans l'air peuvent être détectées et dénombrées conformément à l'ISO 16000-16 et l'ISO 16000-17. Méthode alternative : La présence ou non de contaminations fongiques peut être évaluée en utilisant l'indice ICF.
Seuils	Méthode classique : La concentration maximale doit être spécifiée conformément au référentiel HQE : 500 UFC/m³ Méthode alternative : Présence de contamination fongique : ICF positif Absence de contamination fongique : ICF négatif ou nul	
Mise en œuvre (niveau expertise et coût)	Cet indicateur n'est pas recommandé pour la phase conception.	Expertise : Méthode classique : Echantillonnage sur le terrain et culture en laboratoire Méthode alternative : Echantillonnage sur le terrain et analyse en laboratoire Coût : - Prérequis : équipement - Matériaux : 50 – 200 € par échantillon - Laboratoire : 50 – 200 € par échantillon - Main-d'œuvre